



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
1449 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αρ. Φακ Ι.Υ. 21.11.018/7
Αρ. Τηλ: 22605601
Αρ. Φαξ: 22605491

07 Φεβρουαρίου 2024

Πρόεδρο Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ)
Ιατρούς Μέλη ΠΙΣ
(Μέσω Γενικής Διευθύντριας Υπουργείου Υγείας)

Θέμα: Ενημέρωση ιατρών για έξαρση κρουσμάτων Ιλαράς στην Ευρώπη

Ενόψει των τελευταίων ανακοινώσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του ECDC, παρατηρείται έξαρση περιστατικών ιλαράς σε ευρωπαϊκές χώρες, με σταθερή αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων από τον Ιούνιο του 2023 έως σήμερα. Τα περισσότερα περιστατικά τον Ιανουάριο του 2024 αναφέρθηκαν σε Ρουμανία (932), Ηνωμένο Βασίλειο (198), Αυστρία (17), ενώ σε πολλές χώρες της Ευρώπης καταγράφονται σποραδικά κρούσματα.

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/communicable-disease-threats-report-week-3-2024_0.pdf


Είναι σημαντικό να υπάρχει αυξημένη ευαισθησία για την εντόπιση περιστατικών ύποπτων για ιλαρά. Σύμφωνα με τον ορισμό της ιλαράς, τα κλινικά κριτήρια του ύποπτου περιστατικού περιλαμβάνουν:

- Πυρετό ΚΑΙ
- Κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα ΚΑΙ
- Τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα: βήχα, ρινίτιδα, επιπεφυκίτιδα

Σε περίπτωση ύποπτου περιστατικού για ιλαρά θα πρέπει:

1. Άμεσα να ενημερώνεται τηλεφωνικώς η Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων τηλ. 22605650 ή 22605759 και φαξ. 22771496
2. Να διενεργείται αιματολογικός έλεγχος για ανίχνευση αντισωμάτων IgM κατά της ιλαράς και όλα τα θετικά αποτελέσματα να αποστέλλονται για επιβεβαίωση στο Εργαστήριο Αναφοράς για την Ιλαρά, στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
3. Σε περίπτωση εργαστηριακής επιβεβαίωσης του περιστατικού, να δηλώνεται γραπτώς στο ειδικό έντυπο Δήλωσης Υποχρεωτικών Λοιμωδών Νοσημάτων και να αποστέλλεται με τηλεομοιότυπο στον αρ. 22771496.

Επιπλέον, θα πρέπει να ενθαρρύνεται η ενίσχυση της κάλυψης του πληθυσμού μας με το εμβόλιο Ιλαράς-Παρωτίτιδας-Ερυθράς (MMR), το οποίο χορηγείται με βάση το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού σε 2 δόσεις: από την ηλικία των 12 μηνών (1^η Δόση) και σε ηλικία 4 ετών (2^η Δόση), μπορεί όμως να χορηγηθεί και νωρίτερα, αρκεί να έχουν περάσει 4 εβδομάδες μετά την 1^η δόση. Θα πρέπει να φροντίσετε για την εμβολιαστική κάλυψη των δικαιούχων ασθενών σας.



Δρ. Νίκος Παναγίδης
για Διευθύντρια
Ιατρικών Υπηρεσιών και
Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας