


ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (CHECKLIST) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ



Η αλόγιστη χρήση
αντιβιοτικών ευθύνεται
για την ανάπτυξη
μικροβιακής αντοχής

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΕΞΥΠΝΑ

- + Μην χορηγήσετε αντιβιοτικά εκτός αν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις βακτηριακής λοίμωξης
- + Όπου είναι δυνατόν, συλλέξτε τα κατάλληλα δείγματα για καλλιέργεια **πριν** από την έναρξη αντιμικροβιακής θεραπείας (**αλλά μην** καθυστερήσετε την έναρξη θεραπείας σε ασθενείς με σοβαρές/δυσνηκτικά θανατηφόρες λοιμώξεις)
- + Ελέγξτε το ιστορικό αλλεργιών του ασθενούς, την πρόσφατη χορήγηση αντιμικροβιακής θεραπείας καθώς και τα προηγούμενα αποτελέσματα μικροβιολογικών εξετάσεων
- + Χορηγήστε αντιβιοτικά όσον το δυνατόν στενότερου φάσματος
- + Στην περίπτωση χορήγησης αντιβιοτικών για πρόληψη λοιμώξεων χειρουργικού πεδίου, συνήθως **μία** προεγχειρητική δόση είναι επαρκής. *Συμβουλευτείτε τις κατευθυντήριες οδηγίες που ισχύουν στο νοσηλευτήριό σας*
- + Καταγράψτε την ένδειξη χορήγησης αντιμικροβιακής αγωγής και το όνομα/τη δόση/τον τρόπο χορήγησης του αντιβιοτικού στις ιατρικές σημειώσεις
- + Καταγράψτε την ημερομηνία επανεξέτασης ή τερματισμού της αντιμικροβιακής αγωγής στις ιατρικές σημειώσεις και στο διάγραμμα θεραπείας

ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΤΕ

Στις 48-72 ώρες μετά την έναρξη αντιμικροβιακής αγωγής επαναξιολογήστε την ανάγκη για συνέχισή της

Με βάση την κλινική κατάσταση του ασθενούς και/ή τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών εξετάσεων:

- + Διακόψτε την αντιμικροβιακή αγωγή (αν δεν υπάρχει ένδειξη λοίμωξης)
- + Συνεχίστε την υφιστάμενη αντιμικροβιακή αγωγή
- + Αλλάξτε τον τρόπο χορήγησης της αντιμικροβιακής αγωγής (αλλαγή από ενδοφλέβια χορήγηση σε χορήγηση από το στόματος)
- + Αλλάξτε το αντιβιοτικό που χορηγείτε/προσθέστε άλλα αντιβιοτικά. Αλλάξτε σε αντιβιοτικό στενότερου φάσματος όταν αυτό είναι δυνατόν (αποκλιμάκωση)

Καταγράψτε την
αναθεώρηση της
αντιμικροβιακής αγωγής
στις ιατρικές σημειώσεις

Χορηγήστε την
αντιμικροβιακή αγωγή
για τη μικρότερη δυνατή
χρονική διάρκεια

